

	
Unité d'hémato-oncologie pédiatrie	
Prévention de la mucite chez l'enfant	
Codification du document : IT 3.3.2.7	Rédacteur : Dr Gandemer, Responsable d'Unité
Date d'application : 1/09/08	Approbateur(s) : T. Lamy, Directeur du Programme JACIE
N° de version du document : 1	Gestionnaire : N. Le Hello
Destinataires du document : Classeur salle de soins	
Modifications depuis la version précédente : NA	

1 - But et objet

Définir les modalités de prévention de la mucite dans l'unité d'onco-hématologie pédiatrique. Cette procédure s'applique à tous les enfants pris en charge en secteur de thérapie cellulaire qu'ils soient nourrissons ou grands enfants.

2 - Exigences à appliquer

Manuel JACIE, V3.

3 - Responsabilités

Personnels soignants (IDE/PDE et AP/AS)

4 - Définitions

IDE/PDE : infirmière diplômée d'état/puéricultrice diplômée d'état

AP/AS : auxiliaire de puériculture /Aide soignante

Nourrisson : âge inférieur à 1 an

5 - Actions et méthodes

- Chez le nourrisson (sans dent) :

- 1) toilette de la bouche à la compresse imprégnée de Bicarbonate de Sodium 1,4%.
- 2) passage d'une compresse légèrement imprégnée de Fungizone .

- Chez l'enfant denté avec 6 dents minimum et jusqu'à 2 ans

- 1) brossage des dents ou nettoyage à la compresse sans Eludril ou Hextril. La brosse à dents maintenue dans le flacon d'Hextril sera rincée à l'eau minérale avant le brossage
- 2) toilette de la bouche en rinçage ou à la compresse bien imprégnée de Bicarbonate de Sodium
- 3) passage d'une compresse imprégnée de Fungizone ou une demi-cuillère à café.

- Chez l'enfant de 2 ans et plus :

- 1) brossage des dents sans dentifrice. La brosse à dents maintenue dans le flacon d'Hextril sera rincée à l'eau minérale avant le brossage.
- après le brossage, la brosse à dents sera replacée dans le flacon d'Hextril.
- 2) appliquer trois sprays d'Eludril collutoire : 1 face interne joue à gauche, à droite et 1 palais partie postérieure
- 3) rinçage de la bouche au Bicarbonate de Sodium .
- 4) 1 cuillère à café de Fungizone à déglutir.

NB : La brosse à dents aura des poils souples, synthétiques, type INAVA 7/100 ème

* si lésions : - Hexigel localement.

* si douleurs locales : - Xylocaïne gel (à éviter chez le jeune enfant).

Se référer à la procédure de prise en charge de la douleur en cas de lésions douloureuses

Si possible, ne pas suspendre les soins

6 - Documentations et renvois

- Classeur douleur des unités de soin
- Carnet de soin de l'enfant, Hippo

7 - Enregistrements

Dossier médical du patient