




Risque standard :


- Absence de résidu post-opératoire notable (< 1,5 cm²)
- Absence de métastases :
 - sur la cytologie du LCR (M1)
 - sur l'IRM cérébrale (M2)
 - sur l'IRM médullaire (M3)
 - ou en extra-système nerveux central (M4)
- Médulloblastome sans signe histologique d'anaplasie et sans amplification des oncogènes C-MYC et N-MYC


Haut risque :
Tous les autres cas

**RCP MOLÉCULAIRE
SHH**

Tableau E.2
Médulloblastome non métastatique de l'adulte

RCPS AJA





RCPS AJA

Tableau E.4
Médulloblastome métastatique

BIOPSIE

CHIMIOTHÉRAPIE : CARBO-VP16 2 cycles
RADIOTHÉRAPIE CRANIOSPINALE
(36 Gy sur axe et 54 Gy toute fosse postérieure)
Privilégier TOMOTHÉRAPIE : ICO Nantes ou Quimper ou Caen
CHIMIOTHÉRAPIE : CARBO-VP16 2 cycles (2/3 doses)

OPTION : Autogreffe chez l'enfant et
ICO Nantes

Surveillance des médulloblastomes
desmoplastiques métastatiques

- Examen clinique et IRM craniospinale biannuels



Annexes

T.6 : PNET HR+5
T.7 : PNET 5 MB