




RCPS GLITRAD

Tableau C.2
Tumeur évolutive du tronc cérébral (hors neurofibromatose)

Localisation ?

Facteur diagnostique : recherche mutation H3K27
ou surexpression EZHIP
ou perte de triméthylation si tumeur ligne médiane

Relecture RÉNOCLIP

EXOPHYTIQUE
LOCALISÉE

CHIRURGIE

RCPS

TÉMOTRAD :
Gliome du tronc ne prenant
pas le contraste de type diffus
évolutif cliniquement ou
radiologiquement

TÉMOTRAD

RADIOTHÉRAPIE

Gliome de bas grade — Gliome de haut grade —

- RADIOTHÉRAPIE et
CHIMIOTHÉRAPIE
CONCOMITANTE et
ADJUVANTE (TMZ)
- RT + EVEROLIMUS

BIOMÈDE
2.0

CENTRALE DIFFUSE

BIOPSIE

RCPS

RADIOTHÉRAPIE
et CHIMIOTHÉRAPIE CONCOMITANTE et ADJUVANTE (TMZ) SI HAUT GRADE
ou TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE
ou RT+ EVEROLIMUS

- *Récidive : si mutation H3K27 ou surexpression EZHIP
ou perte de triméthylation : discuter ONC201 (RCP Gustave Roussy)
- Discuter réirradiation du tronc à 9 mois