

INFOS RESEAU

Suivi conjoint des LAL

Pendant la phase intensive

- J1
- J29 de chaque cycle à Rennes
- En fonction des Peg-asparaginase et des PK

Pendant l'entretien

- RI n°1, 4, 7 et 10 en HDJ,
- 13^e, 16^e, 19^e et 22^e mois en consultation

NB : arrêt du lutenyl pendant le traitement d'entretien

- Ablation de cathéter dès que la NFS est stable (2^e ou 3^e mois sous kétamine en HDJ ou sous AG au bloc) .
- Si PAC : on le laisse jusqu'à la fin du traitement.

bilan de fin de traitement

- en HDJ à Rennes
- bilan sanguin , et urinaire,
- moëlle et PL ,
- échographie abdominale chez les filles,
échographie cardiaque
- sérologie tétanos , rougeole ,hépatites B, C et VIH

- arrêt soins de bouche et bactrim à 3 mois de la fin du traitement

suivi

Rythme

- tous les 2 mois la 1^{ère} année (Une fois sur 2 à Rennes soit 3 fois/an)
- tous les 3 mois la 2^{ème} année (une fois sur 2 à Rennes soit 2 fois/an)
- tous les 4 mois la 3^{ème} année (une fois sur 3 à Rennes soit 1 fois /an)
- tous les 6 mois la 4^{ème} année et 5^{ème} année (une fois sur 2 à Rennes soit une fois/an)
- puis tous les ans jusqu'à la puberté (une année sur 2 à Rennes)
- puis selon inclusion dans LEA (tous les 2 ans puis tous les 4 ans à Rennes seulement)

Réaliser

- à chaque consultation : NFS plaquettes
- une fois par an : iono urée créatininémie, BH , ferritinémie
- échographie cardiaque : à 2 , puis 5 ans puis tous les 5 ans
- ophtalmologie /2 ans
- ostéodensitométrie à l'adolescence

vaccinations

- **3 mois après la fin du traitement : DTP:**
reprendre là où on en était (rappel des 6 ans
et rajouter la coqueluche au DTP à 13 ans)
- **6 mois après la fin du traitement : ROR :**
 - <6 ans : faire 2 injections si sérologie négative,
 - >6 ans : une seule injection si sérologie négative