

VACCINATION ANTI-COVID

ET CANCER :

Recommandations vaccinales des patients atteints de cancer à destination des professionnels de santé

❖ IMPORTANTANCE DE LA VACCINATION ANTI-COVID :

Les patients atteints d'un cancer font partie des groupes à risque de développer des complications sévères liées à la COVID-19, notamment en cas de tumeurs malignes bronchiques, métastatiques ou hématologiques, ainsi qu'en cas de traitement systémique. Une infection à la COVID-19 peut retarder la prise en charge médicamenteuse et induire une perte de chance sur l'efficacité attendue.

❖ POINTS DE VIGILANCE AMENANT À ÉVITER LA VACCINATION DANS L'ÉTAT ACTUEL DES CONNAISSANCES :

- Allergie connue sévère (cf. résumé des recommandations françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie 12 janvier 2021 - <https://sfa.lesallergies.fr/vaccination-contre-la-covid-19-et-antecedents-allergiques>)
- Infection à la COVID-19 dans les 3 derniers mois
- Autre vaccination dans les 14 derniers jours
- Infection en cours ou fièvre (>38°C dans les 48 dernières heures)

Les recommandations sur la vaccination ne se substituent pas à la connaissance particulière de l'état des patients atteints d'un cancer par les équipes médicales qui les suivent. La relation médecin/patient, dans le processus de décision partagée conduisant à la vaccination, reste essentielle*.

Vous avez la possibilité de consulter les recommandations de l'INCa sur la vaccination COVID des patients atteints de cancer du 1^{er} février 2021 en tenant compte de l'évolution du calendrier vaccinal.

Dans le cadre de la traçabilité de la vaccination, il est important de noter :

- la date de la vaccination
 - le numéro de lot
 - Le nom de spécialité du vaccin
- ⇒ Si vous constatez des effets secondaires, prenez contact auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV).

**Afin de vous aider dans la prise de décision, différentes recommandations ont été rédigées à ce jour (European Society for Medical Oncology, Institut Gustave Roussy, INCa...). Au vu du contexte sanitaire, ces recommandations peuvent évoluer.*

En cas de complication infectieuse, d'état général altéré ou d'hospitalisation dans un contexte aigu :

⇒ **Report de la vaccination jusqu'à résolution des complications**

RAPPEL : LA VACCINATION DE L'ENTOURAGE DU PATIENT ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE EST CONSEILLÉE.