

## But et objet

Définir les modalités de prévention de la mucite dans l'unité d'onco-hématologie pédiatrique. Cette procédure s'applique à tous les enfants pris en charge en secteur de thérapie cellulaire qu'ils soient nourrissons ou grands enfants.

## Actions et méthodes

### - Chez le nourrisson (sans dent) :

1) toilette de la bouche à la compresse imprégnée de Bicarbonate de Sodium 1,4%.

### - Chez l'enfant avec des dents :

1) brossage des dents sans dentifrice. La brosse à dents maintenue dans le flacon d'Hextril sera rincée à l'eau minérale avant le brossage.

- après le brossage, la brosse à dents sera replacée dans le flacon d'Hextril.

2) Après le brossage, appliquer trois sprays d'Eludril collutoire : 1 face interne joue à gauche, à droite et 1 partie postérieure du palais

3) rinçage de la bouche au Bicarbonate de Sodium 1,4%.

4) 1 cuillère à café de Fungizone à déglutir sur prescription médicale.

NB : La brosse à dents aura des poils souples, synthétiques, type INAVA 7/100<sup>ème</sup> ou 15/100<sup>ème</sup>

\* si lésions : - Dynexan 2% localement.

Si possible, ne pas suspendre les soins

## Responsabilités

Personnels soignants (IDE/PDE et AP/AS)

## Définitions

IDE/PDE : infirmière diplômée d'état/puéricultrice diplômée d'état

AP/AS : auxiliaire de puériculture /Aide-soignante

Nourrisson : âge inférieur à 1 an

## Documentation et renvois

- Classeur douleur des unités de soin

- Carnet de soin de l'enfant, Hippo

### Enregistrements

Dossier médical du patient

Exigences à appliquer :

Manuel JACIE

## Modifications depuis la version précédente

Revue 2022

Intégration dans le logiciel Sherpa en date du 22/07/2021 – ancienne référence du document : IT 3.3.2.7

## Circuit de validation

Rédaction	Approbation
Pr Gandemer	Pr Gandemer, responsable de l'unité
Date de rédaction : [Date fin étape 2]	Date d'approbation : 08/07/2022 00:00:00